

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
LXXXIII. PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS (suite).

Par A. GUILLAUMIN.
PROFESSEUR AU MUSÉUM.

- Zygogynum spathulatum* v. Tiegh. — Mont Koghi (Pancher).
Malvastrum spicatum A. Gray. — Gatope (Vieillard, 153).
Oncotheca Balansæ Baill. — Balade (Vieillard 855).
Pittosporum gracile Panch. ex Brong. et Gris. — Nouméa (Vieillard 866).
Montrouziera sphæroidea Panch. ex Pl. et Tr. — Poume (Deplanche 259).
Corchorus Torresianus Gaud. — Nouvelle-Calédonie (Pancher 3499¹).
Solmsia calophylla Baill. — Pouébo (Vieillard 254).
Fagara oreophila Guillaum. — Sans localité (Pancher).
Dysoxylum Pancheri C. DC. — Sans localité (Pancher).
Salacia Bailloniana Loes. ? — Nouvelle-Calédonie (Baudouin in Vieillard 3075), Poila (Vieillard 869).
S. neo-caledonica Loes. — Balade (Vieillard 318).
Ventilago neo-caledonica Schltr. — Balade (Vieillard 28), « Ari », Canala (Vieillard 1158) ?
Alphitonia xerocarpa Baill. — Balade (Vieillard 1).
Guioa crenata Radlk. — Sans localité (Pancher 609).
Elatostachys apetala Radlk. form. *robustior* Radlk. — Tiaré (Deplanche 273).
Arytera collina Radlk. ? — Lifou : chemin d'Iacho (Deplanche 57) « Heyat » ou « Hékiat ».
Corynocarpus dissimilis Hemsl. ? — C'est probablement à cette espèce que se rapporte l'échantillon en fruits : Lifou (Balansa 2322).
Afzelia bijuga A. Gray. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche 209).
Licania rhamnoides Guillaum. — Canala (Vieillard 29).
Polyosma brachybotrys Schltr. — Diaoué (Vieillard 858).
P. discolor Baill. — Wagap (Vieillard 1152).
P. Pancheriana Baill. — Pouébo (Deplanche 169).
P. spicata Baill. — Balade (Vieillard 262).
Lumnitzera littorae Voigt. — Sud de la Nouvelle-Calédonie (Deplanche 215), Mont Mou (Deplanche 214).
Syzygium lateriflorum Brong. et Gris. — Tiaré (Deplanche 267).
Homalium Le-Ratorum Guillaum. — Mont Koghi (Pancher).

Dizygitheca ouveana Danik. — Est certainement un *Octotheca* à cause de ses étamines à 8 sacs polliniques, ce sera *O. ouveana* Guillaum. nom. nov.

Le dimorphisme foliaire de *D. leptophylla* et *D. tenuifolia* vient sûrement du fait que les espèces sont basés sur des échantillons en train de se caractériser et d'atteindre la forme adulte ; la forme juvénile à feuilles toujours plus étroites se rencontrant sur les rameaux latéraux tandis que la forme adulte se présente sur la tige principale au-dessous de l'inflorescence.

Delarbrea ? *spectabilis* Linden et André = *Arabia spectabilis* Linden = *A. concinna* Hort. n'est certainement pas un *Delarbrea* mais une forme de jeunesse de *Tieghemopanax* voisin de *T. austro-caledonicus* ou *T. decorans*.

Tieghemopanax Pancheri R. Vig. — Balade (*Vieillard* 614 et 615).

Memecyланthus neo-caledonicus Gilg et Schltr. = « *Memecyclon neo-caledonicus* Gilg et Schltr. » in Herb. Mus. Paris. — Sans localité (*Deplanche* 47), Pouébo (*Deplanche* 413 in *Vieillard* 3244).

Vernonia cinerea Loes. — Sans localité (*Pancher* 342), Nouméa (*Vieillard* 790), Gatope (*Vieillard* 793).

Adenostemma viscosum Less. — Nouméa (*Vieillard* 796).

Dichrocephala latifolia DC. — Canala (*Vieillard* 803), Lifou (*Deplanche*) « Na-tu ».

Ageratum conyzoides L. — Nouméa (*Vieillard* 2821), M'bée (*Vieillard* 793).

Pterocaulon cylindrostachyum C.-B. Clarke. — Saint-Vincent (*Vieillard* 813 pro parte), Lifou (*Deplanche* in *Vieillard* 813).

P. glandulosum F. Muell. var. *velutinum* Ewart et Davies — Canala (*Vieillard* 803), Gatope (*Vieillard* 813).

P. sphacelatum Benth. et Hook. f. — Nouméa (*Vieillard* 812).

Lagenophora Billardieri Cass. — Cap Tonnerre (*Vieillard* 816), Cap Deverd (*Vieillard* 816, *Deplanche* 109).

Erigeron Naudinii Bonnier. — Sans localité (*Vieillard* 792, 2816, *Deplanche* 792, *Pancher* 341, 406), Nouméa (*Vieillard* 795), Canala (*Deplanche* 221) « Bnandavi ».

Conyza ægyptiaca Ait. — Wagap (*Vieillard* 2818), Gatope (*Vieillard* 815, 2822).

Blumea bifoliata DC. — Balade (*Vieillard* 601), Gatope (*Vieillard* 601).

B. lacera DC. — Sans localité (*Deplanche* 222, *Vieillard* 2817), Gatope (*Vieillard* 2822).

Gnaphalium japonicum Thunb. — Sans localité (*Pancher* 400), Balade (*Vieillard* 90), Gatope (*Vieillard* 810), Gatope, Gomen (*Deplanche* 225).

G. japonicum Thunb. var. = *G. collinum* Labill. — Wagap, Gatope (*Vieillard* 810), Gatope (*Vieillard* 810).

- G. luteo-album* L. — Sans localité (*Deplanche* 213 et in *Vieillard* 808), Canala (*Vieillard* 809 pro parte).
- Helichrysum neo-caledonicum* Schltr. — Sans localité (*Vieillard* 6), Canala (*Vieillard* 805), Gatope, Wagap (*Vieillard* 806 — 807), Gatope (*Deplanche* 239 in *Vieillard* 805 et in *Mus. néocal.* 93).
- Cotula australis* Hook. f. — Sans localité (*Pancher* 344).
- Siegesbeckia orientalis* L. — Sans localité (*Deplanche* 224, *Vieillard* 2820), île Nou, Nouméa (*MacGillivray* 18), Gatope (*Vieillard* 802, 2819 pro parte).
- Eclipta erecta* L. — Gatope (*Vieillard* 2819 pro parte).
- Wedelia biflora* DC. — Sans localité (*Pancher* 92), Gatope, Balade (*Vieillard* 699), Lifou (*Vieillard* 799 pro parte).
- W. uniflora* S. Moore — Témala, Gatope (*Vieillard* 2823), Cap Tonnerre (*Deplanche* 145), Lifou (*Deplanche* in *Vieillard* 779 pro parte) « *Sesinaya* ».
- Bidens pilosa* L. — Sans localité (*Vieillard* 796, 2820), Wagap (*Vieillard* 797).
- Erechtites quadridentata* DC. — Sans localité (*Vieillard* 791, *Pancher* 408), Gatope (*Vieillard* 814).
- Centaurea melitensis* L. — Nouméa (*Vieillard* 2822 bis).
- Xanthium spinosum* L. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche* 225).
- Sonchus oleraceus* L. — Commun partout (*Vieillard* 818).
- Scævola Balansæ* Guillaum. — Ile des Pins (*Vieillard* 825 pro parte).
- S. Beckii* Zahlbr. var. *robusta* Krause. — Sans localité (*Vieillard*).
- S. cylindrica* Schltr. et Krause. — Sans localité (*Vieillard* 823).
- S. frutescens* Krause. — Nouméa (*Vieillard* 74), île des Pins (*Vieillard* 825 pro parte).
- S. montana* Labill. — Nouméa (*Vieillard* 821), Gatope (*Vieillard* 821 bis), Tanlé (*Deplanche* ? 252, *Deplanche* 137 in *Vieillard* 821 et in *Mus. néocal.* 95).
- Leucopogon Cymbulæ* Labill. — Wagap (*Vieillard* 846, 2829), Gatope (*Vieillard*).
- var. *angustifolius* Brong. et Gris. — Wagap (*Vieillard* 842 = 843 = 845 = 846 = 847 = 848), Paulotche (*Vieillard*).
- L. dammarifolius* Brong. et Gris. — Nouméa (*Vieillard* 837 = 838), Ouatendé (*Vieillard* 837), Paulotche (*Vieillard*).
- L. Pancheri* Brong. et Gris. — Balade (*Vieillard* 846).
- var. *subinterruptus* Brong. et Gris. — Gatope (*Vieillard* 840).
- P. salicifolius* Brong. et Gris ? — Wagap (*Vieillard* 839 ?).
- L. Vieillardii* Brong. et Gris. — Gatope (*Vieillard* 2829).
- Cyathopsis floribunda* Brong. et Gris. — Yaté (*Vieillard* 835).
- Dracophyllum dracænoides* Brong. et Gris. — Yaté, Canala (*Vieillard* 832).

- D. ramosum* Panch. ex Brong. et Gris. — Mont Mou (*Vieillard* 2832), M'bée (*Vieillard* 830).
- D. verticillatum* Brong. et Gris. — Mt de Koitchilou (*Vieillard*).
- Wahlenbergia gracilis* A. DC. — Wagap (*Vieillard* 820).
- Statice australis* Spreng. — Ile des Pins (*Vieillard*).
- Lysimachia decurrens* Forst. — Wagap (*Vieillard* 852), Lifou (*Vieillard* 853).
- Samolus littoralis* R. Br. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 13), île des Pins (*Vieillard* 853).
- Rapanea asymmetrica* Mez. — Paulotche (*Vieillard*).
- R. diminuta* Mez. — Sans localité (*Pancher* 242, 255), Nouméa (*Pancher* in *Vieillard* 2842).
- R. lanceolata* Mez. — Lifou (*Vieillard* 2845, *Deplanche* 24 in *Vieillard* 2845).
- R. modesta* Mez. — Balade (*Vieillard* 889).
- R. neo-caledonica* Mez. — Wagap (*Vieillard* 2835), Poume (*Deplanche* 311, 427, in *Vieillard* 2835 et in *Mus. néocal.* 99), Gatope (*Vieillard* 2837), Gomonen près Gatope (*Vieillard* 2841).
- R. Vieillardii* Mez. — Sans localité (*Pancher* in *Vieillard* 2834), Kokingone, Wagap (*Vieillard* 2843).
- Tapenosperma acutangulum* Mez. — Wagap (*Vieillard* 2850 pro parte).
- T. clethroides* Mez. — Koé (*Deplanche* 25), Wagap (*Vieillard* 2855).
- T. koghiana* Guillaum. — Wagap (*Vieillard* 2840, 2846).
- T. sp. cfr. T. Lenormandii* Mez. — Wagap (*Vieillard* 2854).
- T. oblongifolium* Mez. — Sans localité (*Pancher* 303), Wagap (*Vieillard* 352), Wagap, Touho (*Vieillard* 2849), Balade (*Vieillard* 352).
- T. Pancheri* Mez. — Wagap (*Vieillard* 2848).
- T. pauciflorum* Mez. — Poindimié (*Vieillard* 2853).
- T. psaladense* Mez. — Pouébo (*Deplanche* 431, in *Vieillard* 344 et in *Mus. néocal.*, 103).
- T. robustum* Mez. — Balade (*Vieillard* 856 = 854).
- T. squarrosus* Mez. — Wagap (*Vieillard* 2850 pro parte).
- Chrysophyllum Deplanchei* Baill. — Nouméa (*Deplanche* 436, *Vieillard* 2902, *Pancher* 104).
- Sebertia calomeris* Dänik. — Canala (*Vieillard* 2907).
- Leptostylis filipes* Benth. — Poume (*Deplanche* 451), Gatope (*Vieillard* x, 2914), Gomonen, Gatope (*Vieillard* 2914).
- L. longiflora* Benth. — Sans localité (*Pancher*, *Deplanche* 439, *Vieillard* 2915).
- Ochrothallus dubius* Guillaum. = *Chrysophyllum dubium* Panch. et Seb. non *Sebertia dubia* Pierre. — Canala (*Vieillard* 2881).
- O. Francii* Guillaum. — Sans étiquette.
- Planchonella contermina* Pierre. — Gatope (*Vieillard* 2895, *Pancher* 106).

- P. neo-caledonica* Dub. — Sans localité (*Deplanche* 190), Poume (*Deplanche* 11, 441), Gatope (*Vieillard* 2917).
- P. Pancheri* Pierre. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 32), Saint-Vincent (*Vieillard* 881), île Dubouzet (*Vieillard* 880).
- P. pomifera* Dub. — Vallée de la Tiouaka (*Vieillard* 1704), Balade (*Vieillard* 1704).
- P. viridis* Pierre. — Ile des Pins (*Pancher*).
- P. Wakere* Pierre. — Nouméa (*Vieillard* 2882, Wagap (*Vieillard* 554).
- P. Wakere* Pierre ? — Wagap (*Vieillard* 2883). Identique aux échantillons *Sebert* et *Fournier* 70 et *Pancher* sans n° que Dubard (mss in Herb. Mus. Paris.) pense être une espèce distincte.
- Mimusops parvifolia* R. Br. — Sans localité (*Pancher* 104), Voh (*Deplanche* 443 et sans n°), île Mack (*Deplanche* 97).
- Maba buzifolia* Pers. — Gomen (*Vieillard* 2873), Gatope (*Vieillard* 2873), Varai (*Pancher* 249 in *Vieillard* 2874), Lifou (*Deplanche* 44 in *Vieillard* 2875, *Vieillard* 2875); « *Iet* » à Lifou.
- M. fasciculosa* F. Muell. — Canala (*Vieillard* 903).
- M. foliosa* Rich. ex A. Gray. — Balade (*Vieillard* 892).
- M. glauca* Montr. — Wagap, Gatope, Canala (*Vieillard* 897), Poume (*Vieillard* 2871), Canala, Lifou (*Vieillard* 2877).
- M. rosea* Montr. ? — Pam (*Deplanche* 447, in *Vieillard* 2877 et in *Mus. néocal.* 108).
- M. rufa* Labill. — Sans localité (*Vieillard* 31), Wagap (*Vieillard* 891, 893), Gatope (*Deplanche* 446 in *Vieillard* 2876), Poume (*Deplanche* 116 et 265 in *Vieillard* 2879).
- Diospyros Ebenum* Koen. — Canala (*Vieillard* 901), Wagap (*Vieillard* 898, 2865, 2867, 2868, 2869).
- D. Olen* Hiern. — Lifou (*Vieillard* 2870, *Deplanche* 48), Wagap (*Vieillard* 2866) ?
- Jasminum didymum* Forst. — Sans localité (*Vieillard* 29, 110, 2940), Nouméa (*Vieillard* 96, 912), M'bée (*Vieillard* 2936 pro parte), Ouatendé près Gatope (*Krieger* in *Vieillard* 2937), îlots de Saint-Vincent (*Vieillard* 906), Lifou (*Deplanche* 82 in *Vieillard* 2930), « *Huekee* ».
- var. ? — M'bée (*Vieillard* 2936 pro parte).
- J. elatum* Panch. ex Guillaum., var. *brevistylis* Guillaum. — Canala (*Vieillard* 909), Balade (*Vieillard* 910), Wagap (*Vieillard* 2928), Gatope (*Vieillard* 2929), île des Pins (*Pancher*).

J. Kriegeri Guillaum. sp. nov.

Ramulis glabris, foliis 1 — foliolatis, lamina anguste lanceolata (usque ad 6 cm. × 1,5 cm.), apice obtuse attenuata, basi rotundata, valde coriacea, glaberrima, nervis prominentibus, petiolo circa 1 cm. longo, supra canaliculato, basin versus articulato. Inflorescentiae terminales, bracteis lineari-lanceolatis, minimis, pedicello robusto, circa 1 cm. longo,

calyce turbinato, 5 mm. longo, dentibus parvis, obtusis, corolla, 2 cm. longa, tubo cylindrico, lobis 5, ovato-lanceolatis, staminibus tubi apicem sub attingentibus, antheris omnino sessilibus, obtusis, ovario ovoideo, glabro, stylo glabro, stamina superante, stigmatate vix latiore, lobis haud subulatis.

Gatope (Krieger¹ in Vieillard 2937, Vieillard 2938).

J. Le Ratii Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche in Vieillard 911), Nouméa (Vieillard 28, 37, 2931), Balade (Vieillard 913 pro parte), Gatope (Vieillard 2934, 2938 pro parte), Lifou (Vieillard 2939).

J. noumeense Schltr. — Nouméa (Vieillard 911 pro parte).

— var. **microphyllum** Guillaum. var. vel. sp. nov. ?

Foliis ovatis (1-1,5 cm. × 0,6-0,9 cm.), apice apiculatis. Floribus pedicello 2-3 mm. longo, calyce campanulato, lobis subulatis, tubo paulo brevioribus, corollæ tubo 1,3 cm. longo, lobis ad 6, ovatis, 0,7 cm. longis, antheris levissime exsertis.

Gatope (Vieillard 2935).

Les échantillons : Nouméa (Vieillard 29, 2932, 37, 2931), Gatope (Vieillard 2941) sont tout à fait comparables à ce que Knoblauch (in herb. Mus. Paris.) a nommé *J. promuntorianum* Dänik. ? ce qui me paraît bien douteux.

J. simplicifolium Forst. ? — Gatope (Vieillard 913, 2984).

Osmanthus austro-caledonicus Guillaum. — Sans localité (Deplanche 93), Canala (Vieillard 333), Balade (Vieillard 333).

O. Badula Hutch. — Canala (Vieillard 2863), Balade (Vieillard 327 = 873 = 874 = 333), Poïla (Vieillard 329 = 328), Gatope (Vieillard 2941) ?, Canala, baie d'Urville (Vieillard), île Tupiti (Deplanche 433 in Vieillard 2860 et in Vieillard 2927).

O. vaccinoides Hochr. — Canala (Vieillard 325), Balade (Vieillard 324, 327, 333 = 873 = 874 = 327), Cap Tonnerre (Deplanche 13 = 217); Padaba (Deplanche 93), Lifou (Deplanche 70 in Vieillard 2502) ?

Olea Thozetii Panch. et Seb. — Wagap, Gatope (Vieillard 2861).

1. Krieger était un lieutenant d'Infanterie de marine qui récolta des plantes en 1867 ; celles-ci ont été incorporées par Vieillard dans son herbier.